

Pertussin® Sirup 8 g/100 g

Anwendungsgebiete

Pertussin® Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege.

Pertussin® Sirup wird angewendet bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim und zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis.

Wirkstoff

Der Wirkstoff ist: Fluidextrakt aus Thymiankraut 100 g (entsprechend 77,5 ml) Sirup enthalten 8,0 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1:2-2,5), Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 %, Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1:20:70:109).

Dosierung

Alter bzw. Körpergewicht	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Kinder ab 1- < 4 Jahre (ca. 8 – 16 kg)	10 ml* (entsprechend 1,03 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	3-mal täglich 10 ml* (entsprechend 3,10 g Thymiankraut- Fluidextrakt)
Kinder ab 4-12 Jahre (Ca 16 – 43 kg)	15 ml* (entsprechend 1,55 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	4-mal täglich 15 ml* (entsprechend 6,19 g Thymiankraut- Fluidextrakt)
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	30 ml* (entsprechend 3,10 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	3-4-mal täglich 30 ml* (entsprechend 9,29-12,39 g Thymiankraut-Fluidextrakt)

* Ein entsprechend markierter Messbecher liegt der Packung bei.

Anwendungshinweise

Nehmen Sie Pertussin® Sirup mit etwas Flüssigkeit (z.B. ½ Glas Wasser) ein.

Schütteln Sie die Flasche Pertussin® Sirup vor dem Gebrauch!

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung und ist vom Arzt zu bestimmen.

Warnhinweise:

Enthält 320 mg Alkohol (Ethanol) pro 10 ml Sirup, entspr. 4 Vol.-% Alkohol und Saccharose (Zucker).

Wechselwirkungen & Gegenanzeigen

Pertussin® Sirup darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Thymian oder andere Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuß, Sellerie oder einen der genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Aufgrund des Gehalts an Alkohol kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Patientenhinweise

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 3 Wochen.

Das Arzneimittel sollte nicht mehr eingenommen werden, wenn der Inhalt eine deutliche Trübung zeigt.

Schwangerschaft & Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Pertussin® Sirup soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Hilfsstoffe

Die sonstigen Bestandteile sind: Citronensäure-Monohydrat, Saccharose, Gereinigtes Wasser.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Abanta Pharma GmbH, Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.“